

# DS 2 – 23 NOVEMBRE 2018

Durée : 1h 50 min

Avec Calculatrice

NOM :

Prénom :

Bilan	Cal. Al.		Fonctions		Vecteurs		Repérage	
	Ex 1	Ex 2	Ex 3	Ex 4	Ex 5	Ex 6	Ex 7	Ex 8
/ 40	/ 6	/ 8	/ 5	/ 5	/ 3	/ 3	/ 5 + 2	/ 5

**Exercice 1 - 6 points - (sur le poly)**

Compléter, pour chaque ligne du tableau, la deuxième colonne par votre réponse appropriée.  
(Aucune justification n'est demandée, utilisez un brouillon pour indiquer **que** la réponse)

Question	Votre réponse
Résoudre l'équation : $(x - 2) + (x + 3) = 0$	
Sur le graphique suivant est représentée une fonction $f$ .	<p>L'ensemble de définition de la fonction <math>f</math> est :</p> <p>L'image de <math>-1</math> par <math>f</math> est :</p> <p><math>f(-3) =</math></p> <p>Le(s) antécédent(s) de <math>2</math> par <math>f</math> :</p> <p>Dresser le tableau de variations de la fonction <math>f</math></p>
<p>On considère la fonction <math>g</math> définie par <math>g(x) = 5 - 3x^2</math>.</p> <p>L'image de <math>-2</math> est :</p> <p>Le(s) antécédent(s) éventuel(s) de <math>10</math> par la fonction <math>h</math> définie par <math>h(x) = x^2</math> est (sont) :</p>	
<p>On considère la figure ci-contre tel que <math>(AB)</math> et <math>(CD)</math> sont parallèles</p> <p>La longueur <math>BC</math> vaut :</p>	
<p>On considère la figure ci-contre.</p> <p>dans le repère <math>(O; I; J)</math>, les coordonnées de A sont</p> <p>dans le repère <math>(I; O; J)</math>, les coordonnées de B sont</p>	

**Exercice 2 - 8 points - (sur une copie)**

On pose :  $A = (4x + 3)(2x - 7) - (2x - 7)^2$ .

1. Développer et réduire  $A$ .
2. Factoriser  $A$ .
3. Calculer  $A$  pour  $x = 2$ , pour  $x = -5$  puis pour  $x = 1 + \sqrt{2}$
4. Résoudre l'équation  $A = 0$ .

**Exercice 2 - 5 points - (1. sur une copie, 2. sur le poly)**


On donne ci-contre le tableau de variation d'une fonction  $f$  :

$x$	-5	-2	3	7
$f(x)$	2	4	-2	-1

1. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. On justifiera la réponse.
  - a)  $f$  est croissante sur l'intervalle  $[-2; 4]$ .
  - b)  $f(0) \leq 4$
  - c)  $f(4) > f(5)$
  - d) Le maximum de  $f$  est 7

2. On précise de plus que 0 a pour antécédents :  $-3, -1$  et  $5$ .

Tracer, dans un repère  $(O; I, J)$  une courbe susceptible de représenter la fonction  $f$ .



**Exercice 4 - 5 points - (sur le poly)**

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $[-2; 1]$  par  $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 3$ .

1. Compléter, à l'aide de la calculatrice, le tableau de valeurs suivant (résultat arrondi à 0,01 près) ::

$x$	-2	-1,8	-1,6	-1,4	-1,2	-1	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
$f(x)$																

2. A l'aide de la calculatrice, compléter le tableau de variations suivant :


3. En déduire quelle fenêtre choisir sur la calculatrice pour obtenir la courbe représentative de  $f$  et donner l'allure du tracé obtenu sur la calculatrice

<u>Fenêtre</u>	<u>Allure de la courbe</u>
.....	
.....	
.....	
.....	

**Exercice 5 - 3 points - (sur le poly)**

Soit  $ABCD$  un parallélogramme.  $I, J, K$  et  $L$  sont les milieux respectifs de  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$ .

$$\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{LK} = \overrightarrow{A} \dots$$


$$\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{D}$$

$$\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{A} \dots$$

$$\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{DL} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{C} \dots$$

$$\overrightarrow{LJ} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{D} \dots$$

$$\overrightarrow{JK} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{C} \dots$$

**Exercice 6 - 3 points - (sur le poly)**

ABC est un triangle.

Placer les points  $M$  et  $N$  définis par

$$\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AC}$$

et

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

C  
X

A  
X


B  
X

**Exercice 7** - 5 + 2 points -


(1. Sur le poly, 2. sur une copie)

1. Sur le dessin ci-dessous, placer les points  $M$ ,  $N$  et  $P$  tels que

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AN} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AP} = 2 \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

**BONUS** 2. Montrer que  $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ .**BONUS** 3. Montrer que les droites  $(MN)$  et  $(AP)$  sont parallèles.**Exercice 8** - 6 points - (sur le poly pour 1., le reste sur une copie)Soit  $(O ; I ; J)$  est un repère orthonormal.On donne les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  tels que :  $A(-3; 1)$ ,  $B(1,5; -2,5)$  et  $C(0; 3)$ .

1. Placer les points dans le repère.

2. Calculer les coordonnées du milieu  $K$  de  $[AC]$ . Placer  $K$  dans le repère.3. Le point  $D$  est tel que le quadrilatère  $ABCD$  soit un parallélogramme. Placer  $D$  sur la figure.4. Déterminer les coordonnées de  $D$  par le calcul (On pourra poser  $D(x; y)$ )5. On sait que  $BC = \sqrt{32,5}$ . Calculer  $AB$  puis montrer que  $ABCD$  un losange.

# DS 2 – 23 NOVEMBRE 2018

Durée : 1h 50 min

Avec Calculatrice

NOM :

Prénom :

**Exercice 1 - 6 points - (sur le poly)**

Compléter, pour chaque ligne du tableau, la deuxième colonne par votre réponse appropriée.  
(Aucune justification n'est demandée, utilisez un brouillon pour indiquer que la réponse)

Question	Votre réponse								
Résoudre l'équation : $(x - 2) + (x + 3) = 0$	$\frac{1}{2}$								
Sur le graphique suivant est représentée une fonction $f$ .	<p>L'ensemble de définition de la fonction <math>f</math> est :</p> <p style="text-align: right;">[-3 ; 4]</p> <p>L'image de <math>-1</math> par <math>f</math> est :</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p><math>f(-3) =</math></p> <p style="text-align: right;">3</p> <p>Le(s) antécédent(s) de 2 par <math>f</math> :</p> <p style="text-align: right;">-2 et 3</p>								
<p>Dresser le tableau de variations de la fonction <math>f</math></p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><math>x</math></td> <td style="padding: 2px;">-3</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><math>f(x)</math></td> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">-2</td> <td style="padding: 2px;">4</td> </tr> </table>	$x$	-3	1	4	$f(x)$	3	-2	4
$x$	-3	1	4						
$f(x)$	3	-2	4						
On considère la fonction $g$ définie par $g(x) = 5 - 3x^2$ . L'image de $-2$ est :	-7								
Le(s) antécédent(s) éventuel(s) de 10 par la fonction $h$ définie par $h(x) = x^2$ est (sont) :	$\sqrt{10}$ et $-\sqrt{10}$								
<p>On considère la figure ci-contre tel que <math>(AB)</math> et <math>(CD)</math> sont parallèles</p> <p>La longueur <math>BC</math> vaut :</p>	52								
On considère la figure ci-contre.	<p>dans le repère <math>(O; I; J)</math>, les coordonnées de A sont</p> <p style="text-align: right;"><math>A(1 ; 1)</math></p> <p>dans le repère <math>(I; O; J)</math>, les coordonnées de B sont</p> <p style="text-align: right;"><math>B(0 ; 2)</math></p>								

**Exercice 2 - 8 points - (sur une copie)**On pose :  $A = (4x + 3)(2x - 7) - (2x - 7)^2$ .**1. Développer et réduire A.**

$$\begin{aligned} \text{On a : } A &= (4x + 3)(2x - 7) - (2x - 7)^2 \\ A &= 8x^2 - 28x + 6x - 21 - (4x^2 - 28x + 49) \\ A &= 8x^2 - 22x - 21 - 4x^2 + 28x - 49 \\ A &= 4x^2 + 6x - 70 \end{aligned}$$

**2. Factoriser A.**

$$\begin{aligned} \text{On a : } A &= (4x + 3)(2x - 7) - (2x - 7)^2 \\ A &= (2x - 7)[(4x + 3) - (2x - 7)] \\ A &= (2x - 7)(4x + 3 - 2x + 7) \\ A &= (2x - 7)(2x + 10) \end{aligned}$$

**3. Calculer A pour  $x = 2$ , pour  $x = -5$  puis pour  $x = 1 + \sqrt{2}$** pour  $x = 2$ 

$$\begin{aligned} A &= 4 \times 2^2 + 6 \times 2 - 70 \\ A &= 4 \times 4 + 12 - 70 \\ A &= 16 + 12 - 70 \\ A &= 28 - 70 \\ A &= -42 \end{aligned}$$

pour  $x = -5$ 

$$\begin{aligned} A &= (2 \times (-5) - 7)(2 \times (-5) + 10) \\ A &= (-10 - 7)(-10 + 10) \\ A &= (-17) \times 0 \\ A &= 0 \end{aligned}$$

pour  $x = 1 + \sqrt{2}$ 

$$\begin{aligned} A &= 4 \times (1 + \sqrt{2})^2 + 6 \times (1 + \sqrt{2}) - 70 \\ A &= 4 \times (1 + 2\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2) + 6 \times (1 + \sqrt{2}) - 70 \\ A &= 4 \times (1 + 2\sqrt{2} + 2) + 6 \times (1 + \sqrt{2}) - 70 \\ A &= 4 \times (3 + 2\sqrt{2}) + 6 \times (1 + \sqrt{2}) - 70 \\ A &= 12 + 8\sqrt{2} + 6 + 6\sqrt{2} - 70 \\ A &= 18 + 14\sqrt{2} - 70 \\ A &= -52 + 14\sqrt{2} \end{aligned}$$

**4. Résoudre l'équation  $A = 0$ .**On a :  $A = (2x - 7)(2x + 10)$ 

$$\begin{array}{lll} \text{Alors} & \text{soit} & 2x - 7 = 0 \\ & & 2x = 7 \\ & & x = \frac{7}{2} \end{array} \quad \begin{array}{lll} & \text{soit} & 2x + 10 = 0 \\ & \text{soit} & 2x = -10 \\ & \text{soit} & x = -\frac{10}{2} = -5 \end{array}$$

Donc  $\frac{7}{2}$  et  $-5$  sont solutions de l'équation  $A = 0$ 

$$S = \left\{ -5; \frac{7}{2} \right\}$$

**Exercice 3 - 5 points - (sur une copie)**

On donne ci-contre le tableau de variation d'une fonction  $f$  :

$x$	-5	-2	3	7
$f(x)$	2		4	
		↓		↑
		-2		
				↓
				-1

1. Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse. On justifiera la réponse.

- a)  $f$  est croissante sur l'intervalle  $[-2; 4]$ .

L'affirmation est **fausse**.

D'après le tableau de variation,  $f$  est strictement croissante sur l'intervalle  $[-2; 3]$  et strictement décroissante sur l'intervalle  $[3; 4]$ .

- b)  $f(0) \leq 4$

L'affirmation est **vraie**.

4 est le maximum de  $f$  sur  $[-5; 7]$ .

- c)  $f(4) > f(5)$

L'affirmation est **vraie**.

$f$  est strictement décroissante sur l'intervalle  $[3; 7]$ .

On a  $3 \leq 4 < 5 \leq 7$  donc  $f(4) > f(5)$ .


- d) Le maximum de  $f$  est 7

L'affirmation est **fausse**.

Le maximum de  $f$  est 4.

2. On précise de plus que 0 a pour antécédents :  $-3, -1$  et  $5$ .

Tracer, dans un repère  $(O; I, J)$  une courbe susceptible de représenter la fonction  $f$ .



**Exercice 4 - 5 points - (sur le poly)**

Soit  $f$  la fonction définie sur l'intervalle  $[-2; 1]$  par  $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 3$ .


1) Compléter, à l'aide de la calculatrice, le tableau de valeurs suivant (résultat arrondi à 0,01 près) :

$x$	-2	-1,8	-1,6	-1,4	-1,2	-1	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
$f(x)$	5	5,45	5,62	5,58	5,35	5	4,57	4,10	3,66	3,27	3	2,89	2,98	3,34	3,99	5

2) A l'aide de la calculatrice, compléter le tableau de variations suivant :

$x$	-2	-1,6	0,2	1
$f(x)$	5	5,62	2,89	5

3) En déduire quelle fenêtre choisir sur la calculatrice pour obtenir la courbe représentative de  $f$  et donner l'allure du tracé obtenu sur la calculatrice

**Exercice 5 - 3 points - (sur le poly)**

Soit  $ABCD$  un parallélogramme.  $I, J, K$  et  $L$  sont les milieux respectifs de  $[AB]$ ,  $[BC]$ ,  $[CD]$  et  $[DA]$ .

$$\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{LK} = \boxed{\overrightarrow{AJ}}$$


$$\overrightarrow{AL} + \overrightarrow{KJ} = \boxed{\overrightarrow{AI}}$$

$$\overrightarrow{LJ} - \overrightarrow{AC} = \boxed{\overrightarrow{DA}}$$

$$\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CJ} = \boxed{\overrightarrow{JD}}$$

$$\overrightarrow{AK} + \overrightarrow{DL} + \overrightarrow{BI} = \boxed{\overrightarrow{JC}}$$

$$\overrightarrow{JK} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CJ} = \boxed{\overrightarrow{CD}}$$




**Exercice 6 - 2 points - (sur le poly)**

ABC est un triangle.

**1. Placer les points M et N définis par**

$$\overrightarrow{BM} = 2 \overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}.$$

**Pour info...****2. Les points C, M et N sont-ils alignés ?**

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} + 2 \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{CA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$$

$$= \frac{1}{2} \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$$

$$= -\frac{1}{2} \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AC}$$


D'où  $\overrightarrow{CM} = -2 \overrightarrow{CN}$

Alors les vecteurs  $\overrightarrow{CM}$  et  $\overrightarrow{CN}$  sont colinéaires

Donc les points C, M et N sont alignés.

**Exercice 7 - 5 points + 2 BONUS - (sur une copie)****1. Sur le dessin ci-dessous, placer les points M, N et P tels que**

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AN} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AP} = 2 \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

**2. Montrer que  $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ .**

$$\begin{aligned} \text{On a } \overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AN} \\ &= -\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} \\ &= -(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \frac{3}{2} \overrightarrow{AB} \\ &= -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \frac{3}{2} \overrightarrow{AB} \\ &= \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

On obtient bien  $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ .

**3. Montrer que les droites (MN) et (AP) sont parallèles.**

$$\text{On a } \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AP} = 2 \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AB} + 2 \overrightarrow{AC}$$

D'où  $\overrightarrow{AP} = -\frac{1}{2} \overrightarrow{MN}$

Alors les vecteurs  $\overrightarrow{AP}$  et  $\overrightarrow{MN}$  sont colinéaires

Donc les droites (MN) et (AP) sont parallèles.

**Exercice 8 - 5 points - (sur une copie)**

Soit  $(O ; I ; J)$  est un repère orthonormal.

On donne les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  tels que :  $A(-3 ; 1)$ ,  $B(1,5 ; -2,5)$  et  $C(0 ; 3)$ .

**1. Placer les points dans le repère ci contre.**

**2. Calculer les coordonnées du milieu  $K$  de  $[AC]$ . Placer  $K$  dans le repère.**


On sait que  $K$  est le milieu de  $[AC]$  avec  $A(-3 ; 1)$  et  $C(0 ; 3)$

$$\text{Alors } x_K = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{-3+0}{2} = -1,5$$

$$y_K = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{1+3}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

Donc  $K(-1,5 ; 2)$

**3. Le point  $D$  est tel que le quadrilatère  $ABCD$  soit un parallélogramme. Placer  $D$  sur la figure.**



**4. Déterminer les coordonnées de  $D$  par le calcul (On pourra poser  $D(x ; y)$ )**

On pose  $D(x ; y)$ .

On sait que le quadrilatère  $ABCD$  est un parallélogramme

Donc ses diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$  ont le même milieu : le point  $K$ .

On obtient alors les équations suivantes en écrivant les coordonnées du milieu de  $[BD]$

$$\begin{aligned} x_K &= \frac{x_B + x_D}{2} \\ -1,5 &= \frac{1,5 + x}{2} \\ -1,5 \times 2 &= 1,5 + x \\ -3 - 1,5 &= x \\ -4,5 &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_K &= \frac{y_B + y_D}{2} \\ 2 &= \frac{-2,5 + y}{2} \\ 2 \times 2 &= -2,5 + y \\ 4 + 2,5 &= y \\ 6,5 &= y \end{aligned}$$

Donc  $D(-4,5 ; 6,5)$

**5. On sait que  $BC = \sqrt{32,5}$ . Calculer  $AB$  puis montrer que  $ABCD$  un losange.**

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Calcul de } AB : AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \\ &= \sqrt{(1,5 - (-3))^2 + (-2,5 - 1)^2} \\ &= \sqrt{(1,5 + 3)^2 + (-3,5)^2} \\ &= \sqrt{(4,5)^2 + (-3,5)^2} \\ &= \sqrt{20,25 + 12,25} \\ &= \sqrt{32,5} \end{aligned}$$

- On sait que :
  - $ABCD$  est un parallélogramme
  - $AB = BC = \sqrt{32,5}$

Or si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange.  
Donc  $ABCD$  est un losange